Laboratoire de Chimie Bio-inspirée
Et Innovations Ecologiques
claude.grison@cnrs.fr

Approche interdisciplinaire de l'environnement

COP 15 biodiversité (fin 2022)

Les 5 grands facteurs directement responsables du déclin de la biodiversité :

- le changement de l'exploitation/utilisation des mers et des terres;
- la surexploitation des organismes;
- le changement climatique;
- la pollution;
- les espèces non indigènes envahissantes.

S'adapter ou disparaître

COP 15 biodiversité (fin 2022)

Les 5 grands facteurs directement responsables du déclin de la biodiversité :

- le changement de l'exploitation/utilisation des mers et des terres;
- la surexploitation des organismes;
- le changement climatique;
- la pollution;
- les espèces non indigènes envahissantes.

Site hautement contaminé (Gard): la réponse de la nature

Une pauvre biodiversité, mais:

- Des plantes tolérantes
- Deux plantes hyperaccumulatrices de Zn

**Réhabilitation par
phytoextraction**

Une preuve de concept à grande échelle sur un site hautement contaminé

2008

Gard

- Sol phytotoxique

2012

- 5 000 m² de cultures mixtes
- 36,000 plants de *N.caerulescens*
- 11,000 plants de *A.vulneraria*

2014

Nouvelle Calédonie : une biodiversité exceptionnelle

- Point chaud de la biodiversité
- (88% d'espèces endémiques)
- Lagon calédonien classé au patrimoine mondial de l'Unesco

Nouvelle-Calédonie : Situations de contrastes

Impacts environnementaux : perte de biodiversité, érosion etc. > 23 000 ha de surfaces dégradées

6 ha de réhabilitation par phytoextraction

Environ. Sci. Pollut. Res. 2015, 22, 5592-5607.
Environ. Sci. Pollut. Res. 2015, 22, 5608-5619.
Environ. Sci. Pollut. Res. 2015, 22, 5620-5632
G. Losfeld, B. Fogliani, L. L'Huillier, T. Jaffre, C. Grison

Vers un programme de restauration écologique

1. *Développement d'espèces pionnières*
2. *Installation de légumineuses adaptées*
3. *Augmentation de la biodiversité*

La préservation de la qualité de l'eau est
un enjeu majeur et prioritaire

Les plantes aquatiques comme solutions

Environnement

Ecologie

Traitement écologique des effluents industriels par des plantes aquatiques et écocatalyse

Effluents miniers
Effluents de carrière
Effluents de l'industrie chimique

Filtre végétal

Un exemple démonstratif

La grande mine
des Malines

Des eaux polluées et exposées aux
aléas climatiques

Comment répondre à la réglementation ?

Addition de lait de chaux pour précipiter les éléments métalliques

Formation de boues : de nouveaux déchets indésirables

Modifié par Arrêté du 24 août 2017
- art. 1

Le pH des effluents rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

Une solution dangereuse, coûteuse et non satisfaisante

Traitement écologique des effluents industriels par voie végétale

Vers la famille des acides phénoliques :

Un phénomène passif répondant à des principes de chimie du végétal

- 1- racines de plantes aquatiques autotochtones :
La menthe aquatique comme chef de file

Un procédé simple et industrialisable

Vers la famille des acides phénoliques :

Un phénomène passif répondant à des principes de chimie du végétal

- 2- racines de plantes aquatiques envahissantes :

La jussie d'eau, laitue d'eau et renouée du Japon comme exemples clé

Un encouragement fort pour les programmes de contrôle des EEE

Une matière première végétale abondante à contrôler

Contre-canal du Rhône

Une gestion utile et durable des espèces exotiques envahissantes

Une solution écologique éprouvée à grande échelle et *in natura*

Espèces exotiques envahissantes

Un pilote mobile adaptable à différents contextes

Une solution étendue aux polluants organiques émergents

Racines de plantes
aquatiques pour
le filtre végétal

Une solution étendue aux polluants organiques émergents

COP 15 biodiversité (fin 2022)

Les 5 grands facteurs directement responsables du déclin de la biodiversité :

- le changement de l'exploitation/utilisation des mers et des terres;
- la surexploitation des organismes;
- le changement climatique;
- la pollution;
- les espèces non indigènes envahissantes.

Les espèces exotiques envahissantes sont aussi coûteuses que les catastrophes naturelles

- En 40 ans, les pertes financières induites par les invasions biologiques ont été équivalentes à celles provoquées par les tempêtes ou par les inondations.
- Les coûts des invasions biologiques augmentent plus rapidement que ceux induits par les catastrophes naturelles sur cette période.
- Les investissements dédiés à la prévention et à la gestion des invasions biologiques sont dix fois moins élevés que les pertes financières engendrées par ce phénomène.

1 208 milliards de dollars de pertes financières entre 1980 et 2019 :
Franck Courchamp.

De la préservation des zones humides à une gestion raisonnée des Espèces exotiques envahissantes

2 des **100 espèces envahissantes les plus nuisibles au monde (IUCN)**

Fallopia japonica (Renouée du Japon)

Arundo donax (Canne de Provence)

D'une stratégie de lutte à une gestion durable et raisonnée

Stratégie conventionnelle

Des coûts importants
Une reprise inévitable

Résilience

Une valorisation en chimie verte

Que peut-on faire de ces biomasses
chargées en métaux ?

Comment ?

Une chimie bio-inspirée de la capacité adaptative des plantes au stress abiotique

Environnement

Ecologie

Ecocatalyse®

Chimie verte et durable

The chemistry for future (ANR 2014)

Qu'est-ce que l'écocatalyse ?

Préparation des écocatalyseurs : procédé sobre et flexible

Composition et microstructure des écomatériaux

Ecocatalyse : Structure des écocatalyseurs

terrestrial plants

phytoextraction

aquatic & wetland plants

rhizofiltration / biosorption

Ecocatalyse : la chimie organique revisitée

>3,500 biomolécules synthétisées

>35 brevets, > 75 publications

Le recyclage écologique du Pd

Eco-Pd : l'union fait la force

Eco-Pd

Eco-Pd : composition minérale (wt% ± SD)

Na	Mg	K	Ca	Fe	Pd
5.35	0.74	3.80	8.35	2.03	20.36

Nanoparticules Pd(II) : 2-4 nm

Richard Heck

Ei-ichi Negishi

Akira Suzuki

"for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis"

Des réactions modernes

avec des quantités très faibles de Pd

Suzuki-Miyaura reaction

Heck-Mizoroki reaction

Pas de ligand, pas d'additif, recyclable

Structures inédites et empreinte végétale

Eco-Mn¹

Des clusters de la photosynthèse

Eco-CaMnOx

Des ressources végétales

pour de nouveaux plastiques biodégradables

Pinus

α -pinène

Citrons

(*R*)-(+)-limonène

Briques élémentaires pour de nouveaux
plastiques biodégradables

L'écocatalyse > 3 500 biomolécules

Biocosmétiques

Médicaments
à bas coût

Molécules clés pour
l'industrie chimique

Répulsifs anti-moustiques bio

Une analyse de cycle de vie au service de la décarbonation

Catalyse classique

- Impacts paysagers
- Perte de biodiversité
- Déstockage de carbone
- Production massive de déchets miniers
- Erosion des sols
- Pollution des systèmes aquatiques

- Des traitements métallurgiques, puis chimiques lourds
- Production de déchets
- Empreinte environnementale élevée

Ecocatalyse

- Dépollution des effluents
- Gestion durable et utile des Espèces Exotiques Envahissantes
- Préservation de la ressource en eau et de la vie aquatique

- Des procédés sobres
- Des synthèses vertes et automatisées
- Des catalyseurs recyclables

BIOINSPIR

Laboratoire de chimie bio-inspirée et innovations écologiques

TEAM : Together Everyone Achieves More

Cyril

Préservation/restauration
des écosystèmes
terrestres et aquatiques

Camille Be.

Etudes analytiques
(GC MS/GC FID/SAA FG
/MP AES/HPLC/IR-ATR)

Franck

Kenza

Etudes
structurales

Camille Bi.

Relation
phytotechnologie
- structure

Yvette

Mécanosynthèse

Pierre-A.

Chimie en flux

Yves-Marie

Rationalisation théorique
de l'écocatalyse

Martine

Le langage
de la nature

Lauren

Anthropologie
et biomimétismes

Armelle

Dépollution
à grande échelle

Andrii

Ecocatalyse
à grande échelle

Claude

Directrice
de l'unité

@chim_eco

<http://www.chimeco-lab.com>